

## اداره کاربست نتایج تحقیقات دانشگاه / تأکید بر سازو کارهای ترجمان دانش در دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان همگام با نهضت تولید علم و تلاش به منظور انجام پژوهش‌های تقاضامحور از سال ۱۳۹۲، اداره کاربست نتایج تحقیقات را با مشارکت اعضای کمیته کاربست نتایج تحقیقات و رؤسای مراکز تحقیقاتی راه‌اندازی کرد. سایت اداره کاربست نتایج تحقیقات مشابه با هدف تسهیل اطلاع‌رسانی و ارتباط با گروه‌های مخاطب، راه‌اندازی شده است و در این سایت علاوه بر معرفی این مرکز؛ اهداف، پیام‌های پژوهش، نحوه کاربست نتایج تحقیقات و راهنمای نگارش خلاصه کاربست نتایج تحقیقات گنجانده شده است. همچنین رویکردهای کاربست نتایج تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی همدان، ترجمان دانش و اهتمام به اجرای فرآیند ترجمان دانش از جمله رسالت‌های این اداره بوده و فرم کاربست نتایج تحقیقات در گزارش‌هایی طرح‌های تحقیقاتی اضافه شده است. اداره کاربست نتایج تحقیقات، پیام‌های پژوهش و چگونگی کاربست آنها را متناسب با گروه‌های مخاطب، خلاصه‌سازی و در سایت مربوط درج می‌کند. از آنجا که از روش‌های مختلفی برای بهره‌برداری از دانش و فرآیند ترجمان دانش استفاده می‌شود، از این رو این اداره در تلاش است تا با بهره‌گیری از رویکردهای لازم به صورت فعالانه و غیرفعالانه این مهم را تحقق بخشد. نتایج پژوهش‌های انجام شده با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، بیانگر پیام‌های زیر است. امید است کاربست پیام‌های حاصل از پژوهش‌های بومی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

### پیام‌های پژوهش (۲)

- ❖ ارتقاء کیفیت و استانداردسازی آزمون‌های بالینی (OSCE) ضرورت دارد.
- ❖ آگاهی مدرسان از روشها و فنون تدریس و به کارگیری آنها در فرایند تدریس اهمیت دارد.
- ❖ توجه به روش‌های نوین آموزشی و ترویج این روش‌ها در بین اعضاء هیئت علمی ضروری است.
- ❖ استفاده از مقاطع مغز میزان اثر بخشی آموزش اناتومی اعصاب را افزایش می‌دهد.
- ❖ بررسی میزان رضایت بیماران بخش‌های جراحی با استفاده از روشهای اجرایی حاکمیت بالینی ضروری است.
- ❖ بررسی وضعیت جسمی و بیمای‌های شغلی پرسنل اتاق عمل ضروری است.

- ❖ پیش از استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، بررسی لازم در زمینه وجود بستر مناسب و امکان بکارگیری آن به خصوص در محیط های آموزشی و درمانی باید مورد بازنگری قرار گیرد و بکارگیری آن در سازمان، مستلزم تعهد مدیریت ارشد آن سازمان است.
- ❖ مواجهه با اشعه اثری در تعیین جنسیت جنین ندارد.
- ❖ متغیرهای جنسیتی و زبانی بر سازه ها و فرکانس پایه در بیماران موثر است.
- ❖ کاهش حساسیت سویه های استرپتوکوکوس آگالاکتیه به پنی سیلین به عنوان آنتی بیوتیکی انتخابی برای درمان و پیشگیری از عفونت های ناشی از این باکتری و همچنین افزایش مقاومت این سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک اریترومايسين به عنوان اولین آنتی بیوتیک جایگزین در افراد واجد آلرژی به پنی سیلین، موجب افزایش نگرانی در مورد استفاده از این آنتی بیوتیک ها به ویژه در مورد پیشگیری از بیماری در نوزادان، شده است.
- ❖ استفاده از تکنولوژی PCR در آزمایشگاه های بالینی پزشکان را قادر خواهد ساخت تا درمان آنتی بیوتیک مناسبی را تجویز نمایند.
- ❖ -مداخله مناسب برای درمان مشکلات خواب بیماران افسرده ضروری است.
- ❖ کیفیت زندگی پایین و اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از عوامل تهدید کننده سلامت پرستاران است.
- ❖ لازم است شدت و نحوه کنترل تهوع و استفراغ بارداری از ابتدای بارداری ارزیابی شود.
- ❖ کودکان دچار اختلال در خواندن در درک گفتار در شرایط وجود صدای مزاحم محیط مشکل دارند.
- ❖ متخصصین گفتار درمانی به اهمیت شیوع اختلال لکنت در سنین قبل از دبستان و آگاه سازی جامعه جهت کاهش عوارض اختلال در این جمعیت بیشتر توجه کنند.

- ❖ مهمترین تعیین کننده در انجام رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان در زنان باردار خودکار آمدی است.
- ❖ بررسی و توجه به استرس اکسیداتیو در بیماران با سندرم متابولیک ضروری است.
- ❖ شیوع بیماری بروسلوز در بیماران HIV مثبت بالاتر از جمعیت عادی در جامعه نیست.
- ❖ مهمترین تعیین کننده در انجام رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان در مادران دارای کودکان ۱ تا ۵ سال، کنترل رفتاری درک شده است.
- ❖ انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر درد، می تواند راهی برای ساخت داروی جدید آنالژسیک باشد.
- ❖ فراوانی موقعیت رتوکولون نسبت به کلیه که در حدود ۱ درصد فاصله است.
- ❖ از طریق ماساژ دادن نوزادان نارس می توان وزن گیری آن ها را ارتقاء داده و از بسیاری از مشکلات تکاملی آتی که ناشی از کم وزنی است جلوگیری کرد.
- ❖ با ماساژ دادن نوزادان نارس میتوان مدت زمان بستری آن ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها را کاهش داد.
- ❖ بین توارث ژن های مشخص از لوکوس HLA-DR, DQ و بروز نوروپاتی دیابتی ارتباط وجود دارد.
- ❖ آگاهی خانواده های افراد ناشنوا در زمینه ی اهمیت ارتباط سازنده با فرزندشان می تواند منجر به افزایش تاب آوری افراد ناشنوا شده و کیفیت زندگی اجتماعی این افراد را ارتقا دهد.
- ❖ استفاده از روش های تشخیصی PCR و کشت خون برای تأیید بروسلوز ضروری است.

